



Betreft: Terugkoppeling meting patiënt

Geachte Dr.

In het kader van een wetenschappelijke studie van UAntwerpen/KAVA (toelating EC) werd uw patiënt (NAAM) aangesproken in onze apotheek om deel te nemen aan een pilootproject rond streptokokken A testing in de apotheek. Met deze haalbaarheidsstudie willen we nagaan in welke mate het haalbaar is om *point-of-care testing* van streptokokken A in de apotheek te meten.

Op (DATUM) heeft bovenstaande patiënt zich aangeboden in de apotheek met keelpijn, waarna er een zelftest uitgevoerd werd in de apotheek, onder de begeleiding van een getrainde apotheker.

Het resultaat van deze test is positief/negatief/niet interpreteerbaar.

Hoewel wij er ons van bewust zijn dat deze zelftest niet dezelfde standaard heeft als de onderzoeken in klinisch labo, en een klinisch onderzoek aanvullend zeer belangrijk is, kan het wel zijn dat;

- de patiënt mogelijk geholpen kan worden met een antibioticatherapie aangezien de zelftest een positieve resultaat op streptokokken A gaf.
- gezien het negatieve resultaat van de zelftest, is de patiënt mogelijk het beste geholpen met een (optionele) een lokale, symptomatische behandeling en paracetamol.
- Het resultaat van de zelftest onduidelijk was en we de patiënt daarom graag doorsturen naar u.

Patiënt (NAAM) werd door onze getrainde apothekers ingelicht over deze resultaten en geadviseerd met uw praktijk contact op te nemen ter opvolging van de gevonden waarde.

Mogen wij vragen om ons eveneens op de hoogte te houden van het resultaat van deze opvolging? Op die manier verzamelen we waardevolle informatie over het inzetten van *Point-of-care testen* in de eerste lijn.

- Dit kan best telefonisch op volgend nummer:
- Dit kan best via e-mail op volgend e-mailadres:
- Dit kan best via Siilo, contacteer volgend account:

Met vriendelijke groeten,

Apotheek (NAAM APOTHEEK)

Het volledige protocol kan u hier vinden:

